Les gestes de la désinfection chirurgicale

La durée de la procédure varie selon la technique : par lavage ou par friction

La pulpe des doigts trempée dans la dose prélevée

Les coudes inclus



Paume contre paume par mouvements de rotation

Les avants-bras



1ère dose — 2ème dose

Axiderm® Gel SPS	Chloriseptine® Savon désinfectant +
Friction	Lavage
2 x 45 secondes	2 x 2,5 minutes

Le dos de chaque main avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume de l'autre main

Les poignets



Les deux pouces par rotation de la paume refermée de l'autre main

Le dos des doigts en les tenant dans la paume de la main opposée avec un mouvement d'aller-retour latéral

Les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière



Réf. 1157-04-2022

Chloriseptine® Savon désinfectant +
Axiderm® Gel désinfectant SPS

Axience
"L'expertise Vétérinaire en Hygiène et Désinfection"

Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Axience SAS - Tour Essor - 14, rue Scandicci - 93500 Pantin - 01 41 83 23 10 - contact@axience.fr - www.axience.fr